



COVID-19: panoramica delle tipologie di test

| | Test PCR nasofaringeo | Test PCR salivare | Test antigenico rapido nasofaringeo | Test antigenico rapido nasale | Test fai da te nasale |
|---|--|---|---|--|---|
| <i>Svolgimento dell'analisi</i> | Laboratorio | Laboratorio | Laboratorio | Sul posto (p. es. in farmacia) | Ovunque |
| <i>Prelievo di campioni</i> | Specialista | Chiunque | Specialista | Specialista | Chiunque |
| <i>Disponibilità di test validati</i> | Sì | Sì | Sì | Sì (finora 1 test validato) | No |
| <i>Affidabilità</i> | Molto elevata | Elevata | Elevata | Buona in caso di sintomi; probabilmente più bassa in assenza di sintomi | Buona in caso di sintomi; probabilmente più bassa in assenza di sintomi |
| <i>Indicazione</i> | <ul style="list-style-type: none"> – Persone con sintomi – Persone a rischio – Professionisti della salute – Persone risultate positive al test rapido o al test fai da te | Test a ripetizione, p. es.: <ul style="list-style-type: none"> – nelle imprese – nelle scuole – del personale delle case per anziani – nelle società sportive | <ul style="list-style-type: none"> – Persone con sintomi – Test a ripetizione – In caso di contatto con persone particolarmente a rischio (p. es. visita in una casa per anziani) – Test a richiesta, in farmacia | <ul style="list-style-type: none"> – Test a richiesta, in farmacia – Test a ripetizione se sul mercato sono disponibili test sufficientemente affidabili | <ul style="list-style-type: none"> – Test a richiesta, a casa – Test a ripetizione se sul mercato sono disponibili test sufficientemente affidabili |
| <i>Procedura in caso di test positivo</i> | Isolamento | Test PCR di conferma; isolamento | Test PCR di conferma; isolamento | Test PCR di conferma; isolamento | Test PCR di conferma; isolamento |