



COVID-19 : aperçu des différents types de tests

	Test PCR nasopharyngé ou salivaire	Test PCR salivaire pooling (échantillons collectés)	Test rapide antigénique nasopharyngé	Test rapide antigénique dans le nez	Autotest dans le nez
<i>Analyse</i>	En laboratoire	En laboratoire	Sur place (pharmacie, p. ex.)	Sur place (pharmacie, p. ex.)	N'importe où
<i>Prélèvement</i>	Par un spécialiste	Par toute personne	Par personne spécialement formée	Par personne spécialement formée	Par toute personne
<i>Tests validés</i>	Oui	Oui	Oui	Oui (un test validé jusqu'à présent)	Non
<i>Fiabilité</i>	Très élevée	Élevée	Élevée	Satisfaisante en cas de symptômes ; probablement moins sans symptômes	Satisfaisante en cas de symptômes ; probablement moins sans symptômes
<i>Application</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Personnes symptomatiques – Personnes à risque – Personnel de santé – Personnes dépistées positives via test rapide ou autotest 	Tests répétitifs : p. ex. <ul style="list-style-type: none"> – entreprises – écoles – EMS – associations sportives 	<ul style="list-style-type: none"> – Personnes symptomatiques – Tests répétitifs – Environnement personnes à risque (visiteurs EMS, p. ex.) – Besoin personnel (p.ex. dépistage en pharmacie) 	<ul style="list-style-type: none"> – à sa propre demande (p.ex. dépistage en pharmacie) – Tests répétitifs possibles si suffisamment de tests de qualité sur le marché 	<ul style="list-style-type: none"> – à sa propre demande (dépistage à la maison) Tests répétitifs possibles si suffisamment de tests de qualité sur le marché
<i>Procédure en cas de test positif</i>	Isolement	Test PCR de confirmation ; isolement	Test PCR de confirmation n'est nécessaire que chez les personnes sans symptômes et sans contact avec une personne testée positivement isolement	Test PCR de confirmation ; isolement	Test PCR de confirmation ; isolement