



"Scheda informativa"

Data: 21.04.2021

COVID-19: modello a tre fasi

A marzo 2021 il Consiglio federale aveva definito i principi della sua strategia per la gestione della COVID-19 nei prossimi mesi, principi che ha concretizzato nella seduta del 21 aprile 2021 e su cui ha avviato una consultazione presso i Cantoni e i partner sociali.

La strategia segue i progressi della copertura vaccinale della popolazione svizzera e prevede tre fasi. Il modello su cui si basa descrive le condizioni quadro e i dati rilevanti delle rispettive fasi nonché la strategia di riapertura ad esse collegata. La durata delle singole fasi dipende dalla volontà di farsi vaccinare dei relativi gruppi della popolazione e dall'andamento della campagna di vaccinazione.

Fase di protezione

- **Durata:** fino a quando tutte le persone particolarmente a rischio disponibili a farsi vaccinare non saranno completamente vaccinate (circa fine maggio).
- **Situazione:** la copertura vaccinale è bassa e la vaccinazione delle persone particolarmente a rischio è ancora in corso. Un rapido aumento del numero di casi comporta numerosi ricoveri e decessi.
- **Dispositivo di provvedimenti:** per tenere sotto controllo la pandemia sono necessari provvedimenti severi. I test ripetuti a persone asintomatiche permettono di individuare e isolare rapidamente i focolai.
- **Inasprimenti:** il Consiglio federale ha definito degli indicatori (modificati rispetto alla prima pubblicazione a marzo) e verifica nuovi inasprimenti dei provvedimenti in caso di loro superamento. Non esiste alcun automatismo.
 - Incidenza dei casi su 14 giorni: 450 nuovi contagi per 100 0000 abitanti
 - Media dei ricoveri ospedalieri su 7 giorni: 120
 - Occupazione dei posti letto in cure intense da parte di pazienti COVID-19 (media su 15 giorni): 300
 - Valore R_e : 1.15
- **Riaperture:** considerate le riaperture del 19 aprile 2021 e la fragile situazione epidemiologica, prima del 26 maggio 2021 non saranno praticamente possibili ulteriori riaperture. Il 12 maggio 2021 il Consiglio federale effettuerà un'analisi della situazione ed eventualmente porrà in consultazione un pacchetto di riaperture.

Fase di stabilizzazione

- Durata: fino a quando l'intera popolazione adulta disponibile a farsi vaccinare non sarà completamente vaccinata (circa a fine luglio).
- Situazione: la copertura vaccinale delle persone particolarmente a rischio e la rapida vaccinazione della restante popolazione determinano un calo costante del numero di ricoveri e decessi. In caso di forte aumento di somministrazioni di vaccini si può tuttavia prevedere un'accelerazione dell'epidemia a causa di un calo dell'accettazione delle misure di protezione. Un aumento incontrollato del numero di casi potrebbe ancora sovraccaricare rapidamente il sistema sanitario.
- Dispositivo di provvedimenti: nella fase di stabilizzazione è opportuno portare avanti la strategia di riapertura basata sui rischi per rendere nuovamente possibile la vita sociale, culturale e sportiva in determinati luoghi in cui si svolgono manifestazioni. Non appena la copertura vaccinale avrà raggiunto circa il 40–50%, in determinati luoghi dovrà essere introdotto l'accesso selettivo per persone vaccinate, testate e guarite (certificato COVID-19).
- Inasprimenti: ci si attiene agli indicatori della fase di protezione; fa eccezione l'incidenza su 14 giorni che può aumentare fino al valore di 600 nuove infezioni per 100 000 abitanti.
- Riaperture: possono essere effettuate riaperture quando il numero di casi, i ricoveri e l'occupazione delle cure intense risultano stabili o in calo nella settimana precedente la riapertura. Con il proseguimento della strategia di riapertura basata sui rischi si creano ulteriori possibilità sociali, culturali e sportive.

Possibili riaperture nella fase di stabilizzazione:

- consentire l'insegnamento presenziale nel livello terziario (se si effettuano test settimanali);
- sostituire l'obbligo del telelavoro con una raccomandazione (se i collaboratori si possono sottoporre almeno una volta alla settimana a un test);
- allentare le limitazioni di capacità nel settore del commercio al dettaglio;
- allentare le limitazioni di capacità nel settore dello sport ed eventualmente delle strutture per il tempo libero;
- in caso di situazione epidemiologica molto buona: spazi interni dei ristoranti.

Fase di normalizzazione

- Durata: non appena l'intera popolazione adulta avrà avuto accesso a una vaccinazione completa (se circa il 30% degli appuntamenti di vaccinazione resta libero).
- Situazione: anche in caso di elevata disponibilità a farsi vaccinare, molte persone restano non vaccinate (per esempio i bambini e coloro che non possono o non vogliono farsi vaccinare). Per questo motivo anche nella fase di normalizzazione è possibile un rapido aumento del numero di casi e il sovraccarico del sistema sanitario. È importante che chi decide di non farsi vaccinare sia consapevole del rischio di contagio.
- Dispositivo di provvedimenti: i provvedimenti della Confederazione sono finalizzati ad assicurare il funzionamento del sistema sanitario.
- Riaperture: le restanti chiusure di aziende e strutture nonché limitazioni di capacità devono essere revocate gradualmente. Le misure di base (come p. es. indossare la

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Sezione Media e comunicazione, www.bag.admin.ch
La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.

mascherina in luoghi frequentati) devono essere abolite gradualmente per seguire l'andamento della pandemia.

- **Inasprimenti:** in caso di rischio di sovraccarico del sistema sanitario il Consiglio federale adotta esclusivamente provvedimenti di limitazione nei confronti di persone che non si sono fatte vaccinare. Le persone con certificato COVID-19 valido (vaccinate, guarite e testate di recente) non devono essere interessate dai provvedimenti.

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Sezione Media e comunicazione, www.bag.admin.ch
La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.